

Bilan de la nidification des espèces rares du site Ramsar des Étangs de la Champagne humide



2024



Sommaire

- Définition	p. 3
- Pygargue à queue blanche	p. 4
- Balbuzard pêcheur	p. 4
- Marouette poussin	p. 5
- Râle des genêts	p. 5
- Canard souchet	p. 6
- Sarcelle d'hiver	p. 6
- Butor étoilé	p. 7
- Blongios nain	p. 7
- Spatule blanche	p. 8
- Vanneau huppé	p. 9
- Guifette moustac	p. 10
- Mouette mélanocéphale	p. 10
- Panure à moustache	p. 12
- Cisticole des joncs	p. 12
- Gorgebleue à miroir	p. 13
- Bouscarle de Cetti	p. 13
- Locustelle luscinioides	p. 14
- Importance des sites protégés	p. 15
- Tableau synthétique	p. 16

Définition

Les espèces nicheuses rares sont celles dont les effectifs sont réduits et/ou très localisés. Plusieurs origines de ce statut peuvent être identifiées :

- **Espèces en déclin** avec quelques individus relictuels. Sur ces espèces l'enjeu est grand pour éviter la perte de l'espèce localement. (ex : Rôle des genêts)
- **Espèces en reconquête** après avoir disparues. C'est le cas principalement de grandes espèces qui retrouvent leurs territoires d'antan après que des mesures de protection et/ou des réintroductions aient été menées. (ex : Pygargue à queue blanche)
- **Espèces en expansion**. Il s'agit parfois d'espèces méridionales qui remontent vers le nord, souvent en lien avec le changement climatique. Certaines espèces sédentaires ont pu disparaître après des hivers rigoureux et reviennent grâce aux hivers plus doux. (ex : Bouscarle de Cetti)
- **Espèces disparues** avec des retours ponctuels d'individus en période de nidification. Il est probable que ces derniers ne se reproduisent pas, faute de partenaire. Il s'agit le plus souvent de mâles chanteurs isolés. (ex : Marouette poussin)
- **Espèces localisées** et réparties sur seulement quelques sites favorables à leur reproduction. (ex : Guifette moustacs)

Ces différents cas peuvent se cumuler, ou bien être la conséquence d'un autre. Par exemple une espèce peut devenir localisée, car disparue du reste des sites auparavant occupés.

Pygargue à queue blanche

Nombre de couples reproducteurs en 2024 (Ramsar ECH) : 2

Après le succès de reproduction d'un premier couple sur le site Ramsar en 2019, la Champagne humide en accueille maintenant un deuxième.

Il s'agit du 7^{ème} couple Français. L'espèce est en expansion grâce aux mesures de protection associées au retour d'individus en provenance du reste de l'Europe.

Le Pygargue à queue blanche, comme les autres rapaces, a bénéficié d'une baisse de la persécution à son encontre au cours de ces 50 dernières années.



Balbuzard pêcheur

Nombre de couples reproducteurs en 2024 (Ramsar ECH) : 1

A l'instar du Pygargue, le Balbuzard pêcheur recolonise ses anciens territoires.

Deux couples cantonnés en période de reproduction sont trouvés en 2024, en plus du couple déjà installé sur le site Ramsar ECH.

Dans le cadre du Plan National d'Actions Aigles pêcheurs, la LPO Champagne-Ardenne a programmé la pose de plateformes à Balbuzards pour aider cette espèce à nicher.

Le Balbuzard apprécie d'avoir à disposition plusieurs sites de nidification potentiels. Le cantonnement d'adultes en période de nidification est de très bon augure pour le succès de ce type de dispositif.



Marouette poussin

Nombre de mâles chanteurs en 2024 (Ramsar ECH) : 1

Seule une dizaine de mâles chanteurs sont répertoriés chaque année en France. Ce rallidé habite les roselières et la végétation dense de milieux humides.

Un mâle chanteur est entendu entre le 9 et le 30 mai sur la RNR des étangs de Belval-en-Argonne, un site où l'espèce a déjà été contactée auparavant.

Les preuves de reproduction sont très difficiles à obtenir tant cet oiseau est discret, mais il paraît improbable de voir des populations fournies s'établir.



© Frans Vandewalle

Rôle des genêts

Nombre de mâles chanteurs en 2024 (Ramsar ECH) : 2 à 3



© Ron Knight

Après deux années sans contact de Rôle des genêts en Champagne-Ardenne, un, puis deux, et peut-être trois mâles chanteurs sont entendus dans les prairies humides de la vallée de la Voire. Les conditions météorologiques de l'est de l'Europe expliquent sans doute le retour de ces individus.


Il est à espérer que les mesures de protection (retard de la fauche), mises en place cette année 2024 grâce au Plan National d'Action auront permis aux couples d'élever des jeunes. Une douzaine d'individus ont été détectés en 2024 en Champagne-Ardenne.

Canard souchet

Hivernant relativement commun, les preuves de reproductions de Canard souchet en Champagne sont rarissimes. Si des mâles sont régulièrement observés en période de reproduction, il est difficile de faire la différence entre individus erratiques et reproducteurs.

On ne compte que 8 reproductions sur le site Ramsar ECH depuis 2012.

En 2024, un nid avec des œufs a été trouvé sur l'étang de la Forêt à Outines.



© Denis Fourcaud

Sarcelle d'hiver



© Fabrice Croset

La Sarcelle d'hiver hiverne en grand nombre sur le site Ramsar ECH (plus de 60 000 lors des pics de présence). Cependant, elle demeure rare en période de reproduction.

La nidification de l'espèce n'est confirmée en 2024 que sur la RNR de l'étang de Ramerupt.

A noter que la Sarcelle d'hiver peut se contenter de petite pièce d'eau, et donc passer inaperçue.

Butor étoilé

Nombre de mâles chanteurs en 2024 (Ramsar ECH) : 0

Spécialiste des grandes roselières, le Butor étoilé faisait partie intégrante de l'avifaune nicheuse du site Ramsar ECH. Aujourd'hui, on ne compte plus que de rares observations estivales ainsi que quelques données d'individus hivernants ou en migration.

Bien qu'aucun mâle n'ait été entendu chanter cette année sur le site Ramsar ECH, un individu en période de reproduction a été observé à deux reprises sur la RNR des étangs de Belval-en-Argonne. La probabilité qu'un couple soit installé reste cependant assez faible.

Les étangs de Belval-en-Argonne sont le dernier endroit du site Ramsar ECH où des mâles chanteurs ont été contactés ces dernières années.



© Peter Nijland

Blongios nain

Nombre de mâles chanteurs en 2024 (Ramsar ECH) : 32-39

L'année 2024 a été très bonne pour le Blongios nain. On dénombre sur le site Ramsar ECH un minimum de 32 territoires répartis comme suit :

- 8 à 10 sur la RNR des étangs de Belval-en-Argonne ;
- 7 sur les lacs de la Forêt d'Orient ;
- 4 sur la RNN des étangs de la Horre ;
- 10 à 15 sur la RNCFS du lac du Der et des étangs d'Outines (5-7 sur les étangs et 5-8 sur le lac) ;
- 1 sur la RNR des Paquis à Larzicourt ;
- 2 sur une ancienne gravière à Vitry-en-Perthois.

Spatule blanche

Nombre de couples en 2024 (Ramsar ECH) : 2

Comme en 2023, des Spatules blanches ont tenté de nicher dans la héronnière mixte du lac du Der. Des individus ont été observés transportant des branches au début de l'été et au moins deux couples fréquentaient régulièrement la héronnière.

Cependant, aucune preuve de reproduction n'a été constatée. L'âge des Spatule en question interroge. En effet, si ces dernières ne sont plus des juvéniles, elles n'avaient pas encore de plumage nuptial à proprement parler (teinte ocre sur la poitrine et huppe développée).

Le retour de Spatules en période de reproduction avec des comportements de nicheurs est tout de même encourageant et il est fort probable que la Spatule blanche fasse partie de l'avifaune nicheuse du site Ramsar ECH dans les prochaines années.



© Denis Fourcaud

Nombre de couples en 2024 (Ramsar ECH) : 2

A Black-bellied Plover is shown in profile, facing right. It has a black cap with a long, thin, upright crest. Its face is white with a black stripe through the eye. The neck and upper breast are black, while the lower breast and belly are white. The wings and back are dark brown. It is standing in a field of green grass and small yellow flowers. In the background, there is a body of water with some reeds or tall grasses.

La reproduction commence parfois dès le mois de février et on observe en début d'été fréquemment des regroupements de jeunes ou d'adultes ayant échoué qui ne sont pas à attribuer à des reproducteurs.

9

Guifette moustac

Nombre de couples reproducteurs en 2024 (Ramsar ECH) : 42

L'arrivée de la Guifette moustac nicheuse en Champagne est récente, l'espèce n'était avant que de passage en migration. C'est en 2019 que les premiers couples s'installent à l'étang des Landres.

Aujourd'hui encore, l'étang des Landres, qui fait partie de la RNCFS du lac du Der et des étangs d'Outines et d'Arrigny, est le seul étang accueillant une colonie du site Ramsar ECH, et même du Grand Est.

Cet étang est un des rares à avoir d'assez grands massifs de Nymphéas (*Nymphaea alba*) où les Guifettes peuvent construire leurs nids.

En 2024, un comptage des nids par prise de vue aérienne a permis de compter 42 nids.



© Denis Fourcaud

Mouette mélanocéphale

Nombre de couples reproducteurs en 2024 (Ramsar ECH) : 4

La Mouette mélanocéphale niche en Champagne-Ardenne dans les colonies de Mouettes rieuses. Les gravières du Perthois, au nord du lac du Der, accueillent l'intégralité des couples reproducteurs.

Les précipitations du printemps 2024 ont entraîné la submersion des îlots accueillant une des colonies de mouettes sur les gravières du Perthois. Cette colonie s'est en partie reportée vers d'autres îlots aménagés spécialement pour elles, ainsi que pour les Sternes pierregarins.

Seuls 4 nids, contre 27 en 2023, ont été détectés lors du passage en drone parmi plus de 540 nids de Mouettes rieuses et 119 de Sternes pierregarins.

Prise de vue par drone de la colonie de Mouettes et Sternes de Matignicourt-Goncourt (51)



Panure à moustache

La Panure à moustache est un passereau spécialiste des roselières. Sédentaire, elle souffre des hivers rigoureux mais sa tendance erratique lui permet de revenir sur des sites d'où elle avait disparue.

Ainsi, après 7 ans sans que l'espèce ne s'y soit reproduit, une famille composée d'une femelle et de cinq juvéniles déjà volants est observée en juillet à la RNR des étangs de Belval-en-Argonne.



© Stefanie Leuker

Cisticole des joncs

Comme la Panure à moustache, la Cisticole des joncs est un passereau sédentaire.

A la différence de cette dernière, elle n'occupe pas les roselières et préférera les zones avec une végétation herbacée lâche et assez basse, qu'elle soit sèche ou humide.

Les populations de Cisticole des joncs sont caractérisées par des phases d'expansion (comme c'est le cas en ce moment) et d'extinction lors des vagues de froids hivernales.

Des mâles chanteurs ont été entendus sur la RNR des prairies humides de Courteranges ainsi que dans une prairie à côté du lac d'Orient (Mesnil-Saint-Père).



© Valentin Field


Gorgebleue à miroir



© Denis Fourcaud

La Gorgebleue à miroir est une espèce dont l'expansion récente, il y a une vingtaine d'année, lui a permis d'être présente sur une grande partie des sites favorables de Champagne humide, à l'exception des lacs de la Forêt d'Orient.

On notera donc en 2024, la présence d'un mâle chanteur au lac Amance qui sera rejoint par une femelle mais sans donner de suite.



L'espèce pourrait continuer d'étendre son territoire et occuper les lacs aubois et étangs annexes, jusqu'alors exempts de couples.


Bouscarle de Cetti

La Bouscarle de Cetti est une espèce en expansion sur le site Ramsar ECH.

Elle n'était quasiment pas présente en Champagne humide avant 2020 et on compte aujourd'hui une trentaine de couples.

Les principaux sites sont les étangs d'Outines ainsi que ceux de Belval-en-Argonne.

De petits effectifs sont également présents sur quelques sites de Champagne humide.



-  Reproduction possible
-  Reproduction probable
-  Reproduction certaine

Locustelle lusciniöide

Ce passereau spécialiste des roselières n'est présent que sur une poignée de plans d'eau du site Ramsar ECH.


En 2024, la Locustelle lusciniöide a été entendue sur la RNR des étangs de Belval-en-Argonne (10 mâles chanteurs), les étangs d'Outines (12 chanteurs) et la RNN de l'étang de la Horre (minimum de 4 chanteurs).

En 2024, une Locustelle lusciniöide est entendue sur les roselières de la RNN de Forêt d'Orient, et une autre sur l'étang d'Élise-Daucourt (51).

L'espèce a subi une diminution drastique de ses effectifs et a disparu de nombreux sites en Champagne-Ardenne. Elle accuse une perte de 70% de sa répartition entre 1985 et 2015.



© Bas Kers



- Reproduction possible
- Reproduction probable
- Reproduction certaine

Importance des sites sous protection réglementaire

Une grande partie des observations des espèces du présent document ont été réalisées sur des espaces protégés. Sur le site Ramsar ECH, trois types de Réserves naturelles sont représentées : RNCFS, RNN et RNR.

Bien que ces espaces bénéficient d'une pression d'observation conséquente de part leur statut, les milieux qu'on y trouve sont attractifs pour la biodiversité. Ce n'est donc pas par hasard qu'une partie importante des espèces soient présentes sur ces sites.

Le tableau suivant (p. 15), récapitule les effectifs par espèces et les principaux sites où elles sont représentées.

Protéger les espèces rares est crucial pour préserver les écosystèmes dans leur ensemble. Beaucoup d'entre elles agissent comme des espèces parapluie, et leur protection bénéficie à de nombreuses autres espèces partageant le même habitat. En sauvegardant ces habitats, on préserve tout un écosystème associé, souvent composé d'une grande diversité d'espèces moins visibles qui dépendent elles aussi de ces espaces.

Espèces	Sites protégés							Autres sites	Total
	RNN Belval-en-Argonne	RNCFS Outines & Der	RNN Forêt d'Orient	RNN la Horre	RNR Rame-rupt	RNR Larzicourt	RNR Courte-ranges		
Pygargue à queue blanche									2 couples*
Balbusard pêcheur									3 couples*
Marouette poussin	1								1 mâle chanteur
Râle des genêts								2-3	2 à 3 mâles chanteurs*
Canard souchet		1							1 nichée
Sarcelle d'hiver					1	1			2 nichées
Spatule blanche		2							2 couples*
Vanneau huppé									> 8 couples
Butor étoilé	1								1 individu 0 mâle chanteur*
Blongios nain	8-10	10-15		4		1		9	~35 mâles chanteurs
Guifette moustac		42							42 nids*
Mouette mélanocéphale								4	4 nids*
Panure à moustaches	1								1 femelle avec 5 jeunes
Cisticole des joncs							1	1	2 mâles chanteurs
Gorgebleue à miroir	27	15		x				x	>50 mâles chanteurs
Bouscarle de Cetti	4-6	13		3		2		> 10	>30 mâles chanteurs
Locustelle lusciniôide	10	12	1	> 4				1	~30 mâles chanteurs

* : comptage exhaustif



Rédaction et réalisation
LPO Champagne-Ardenne

Octobre 2024



Etangs de Belval-en-Argonne – photo par drone