

INFO OISEAUX

Le bilan hebdomadaire des oiseaux au Der

Période du jeudi 20 février au mercredi 28 février 2024

LPO Champagne-Ardenne
Ferme des Grands Parts - D13
51290 OUTINES

n°160

Migration des grues

D'importantes journées de migration sont notées en France, les grues d'Espagne passent en nombre entre le sud-ouest et le Grand Est. Tous les jours, des grues s'arrêtent au Lac du Der et repartent en migration le matin. A noter que l'agrainage à la Ferme aux grues, à Saint-Rémy-en-Bouzement à l'ouest du lac, est en fonctionnement depuis mi-février, les grues viennent donc s'y alimenter en particulier le matin. L'agrainage va prendre fin ce 3 mars, afin de ne pas inciter les individus immatures à rester dans le secteur et potentiellement faire des dégâts dans les semis de cultures de printemps.


Découvrez la Bouscarle de Cetti

En France, l'aire de reproduction de la Bouscarle de Cetti correspond au climat méditerranéen et océanique. Elle est donc présente dans les départements méditerranéens et du littoral Manche-Atlantique, ainsi qu'en plaine, dans les bassins versants de la basse Loire, de la Garonne et du Rhône. Elle est assez rare dans le quart nord-est et le Centre. A l'inverse des autres fauvettes insectivores, qui hivernent en Afrique pour trouver leur nourriture, la bouscarle présente un taux de sédentarité élevé, ce qui la rend très vulnérable lors d'hivers très froids ; les insectes venant à manquer. De ce fait, les territoires conquis après plusieurs saisons favorables peuvent vite se vider au moindre hiver rigoureux, qui éradique les populations. Chez nous la Bouscarle de Cetti est ainsi très rare. Mais en raison du dérèglement climatique, elle est en augmentation depuis quelques années. Les hivers étant moins froids, elle résiste aux périodes de gel qui sont souvent plus courtes aujourd'hui. La bouscarle est inféodée aux roselières d'étangs et à la végétation buissonnante des cours d'eau.



A. POVEDANO

Hiver favorable pour la bouscarle !



Observations marquantes

- 16 1 Harle huppé
- 1 Grand Corbeau
- 13 64 Cygnes de Bewick
- 3 Pygargues à queue blanche
- 68 Oies rieuses
- 1 Aigle impérial
- 3 Fuligules milouinans
- 4 Macreuses brunes
- 1 Mouette mélanocéphale
- 1 Goéland pontique
- 12 1 Bouscarle de Cetti
- 7 2 Plongeurs imbrins
- 1 1 Guifette moustac

D'autres espèces visibles

- Aigrette garzette
- Bruant des roseaux
- Busard des roseaux
- Chevalier culblanc
- Combattant varié
- Courlis cendré
- Faucon pèlerin
- Garrot à œil d'or
- Goéland brun
- Goéland cendré
- Harle bièvre
- Martin-pêcheur
- Milan royal
- Nette rousse
- Pic mar
- Pipit spioncelle
- Râle d'eau
- Tadorne de Belon

Observateurs : C. Boutrouille, H. Debry, J. Demeulle, L. Encina, V. Field, Q. Guibert, A. Herrera, N. Leclerc, C. Meester.

D'après les données de faune-grandest.org



Pour partager vos observations, téléchargez l'application Naturalist



Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site faune-grandest.org

