n°22

INFO OISEAUX

Lacs de la Forêt d'Orient

Le bilan hebdomadaire des oiseaux sur les Lacs de la Forêt d'Orient

LPO Champagne-Ardenne
Ferme des Grands Parts - D13
51290 Outines

29 octobre 2026

Migration des grues

La migration est lancée, plus de 44 000 Grues cendrées ont pu être comptées au-dessus du lac du Temple le 27/10/2026. Plusieurs départements sont concernés par la migration, l'axe nord-est/sud-ouest est bien représenté. Certains vols sont signalés dans les Pyrénées, les Grues rejoignent l'Espagne grâce aux conditions météos favorables.

Pour suivre les actualités de la migration des Grues cendrées : Site LPO Champagne-Ardennes - Migration au jour le jour.

https://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/migration-et-hivernage/la-migration-des-grues-cendrees-au-jour-le-jour

Découvrez la Cisticole des joncs

La Cisticole des joncs est une espèce polytypique, dont les populations sédentaires se répartissent sur les continents eurasiatique (Europe occidentale et méridionale, Asie du Sud-est et Japon), africain (Afrique du Nord, du Sahel jusqu'à l'Afrique du Sud) et en Océanie (Nord de l'Australie). En France, l'espèce est surtout présente sur les façades atlantique et méditerranéenne (Corse incluse), là où les hivers sont suffisamment cléments pour assurer la survie de cette espèce sensible au froid. Les vagues de froid lui sont d'ailleurs défavorable et peuvent entrainer des rétractations significatives de l'aire de répartition. La Cisticole des joncs affectionne les zones dégagées à végétation basse et évite les zones arborées. On la rencontre dans les prairies ouvertes, sèches ou humides (inondées de façon saisonnière), les terres en jachère et cultivées, les pâturages et occasionnellement en milieu urbain. C'est un petit oiseau trapu, au plumage brun sableux. Les ailes et la queue sont courtes et arrondies. Le dessus est nettement strié et le dessous est blanc avec les flancs jaune paille. Chez la femelle la calotte est striée et le bec est brun clair, noir chez mâle dont la calotte est sombre. Plutôt discrète le reste du temps, son vol chanté ondulant et constitué d'un « dzic » aigu et répété permet de la détecter facilement avant qu'elle ne replonge à couvert dans la végétation.

© Lucas Carré

Les 1ers Bewick sur le lac Amance !



Points d'observation Observatoires Limite de la Réserve Naturelle Nationale

Pour partager vos observations, télécharger l'application Naturalist

Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site faune-grandest.org

Agir pour la biodiversité

Observations marquantes

- 6 — 1 Cisticole des joncs
- 6 — 1 Fuligule milouinan
- 6 — 1 Pygargue à queue blanche
- 15 — 1 Bécassine sourde
- 15 — 1 Hibou des marais
- 26 — 1 Bécasseau minute
- 26 — 1 Ibis falcinelle
- 26 — 21 Cygnes de Bewick

D'autres espèces visibles

- Autour des palombes
- Bécasseau variable
- Bécassine des marais
- Bouvreuil pivoine
- Busard des roseaux
- Busard Saint-Martin
- Chevalier gambette
- Cigogne blanche
- Combattant varié
- Courlis cendré
- Goéland cendré
- Grèbe castagneux
- Grue cendré
- Martin-pêcheur d'Europe
- Milan royal
- Pluvier doré
- Tadorne de Belon

Observateurs : L. Dupuis, F. Croset, S. Gaillard, A. Dnaiel, A. Pavillet, G. Balandras, F. Carré

D'après les données de faune-grandest.org